

Tarrant County Public Health 17P Initiative

La inyección 17P es un tratamiento de progesterona que puede prevenir que usted tenga su bebé antes de tiempo.

¿Soy elegible para la inyección 17P?

Es elegible si, (1) está esperando un solo bebé y 2) si ha tenido al menos un parto premature (de un solo bebé) entre 20 y 36 semanas de gestación.

¿Cuándo se debe de empezar las inyecciones 17P?

Generalmente, las inyecciones se deben empezar entre las 16 y 20 semanas de gestación. Sin embargo, si empezó su cuidado prenatal tarde, puede empezar las inyecciones hasta las 23 semanas.

¿Se debe continuar la 17P hasta las 36 o 37 semanas?

Para prevenir el parto prematuro, estas inyecciones deben continuar hasta las 36 semanas.

¿Cómo se administra la 17P?

Debido a que la progesterona se queda en su cuerpo aproximadamente una semana, la 17P se debe administrar cada siete días. El intervalo de días sugeridos entre las inyecciones de 17P es de 5 a 9 días. Este intervalo puede ser útil para planear sus citas durante días festivos o cuando tenga una cita en retraso.

¿Es seguro el tratamiento 17P para las madres?

Hay un mínimo riesgo para las madres que están tomando la 17P para reducir el riesgo de otro parto prematuro. Los más comunes efectos son dolor, irritación, comezón, moretones, e inflamación donde se aplicó la inyección.

¿Es seguro el tratamiento para el bebé?

Estudios han demostrado que la 17P es seguro y no aumenta el riesgo de malformación congénita.

Recuerde: Pregunte a su proveedor de salud sobre la inyección 17P.

Para más información, por favor llamar al Programa para la Prevención de Parto Prematuro del Departamento de Salud Pública del Condado Tarrant al 817-321-4717, o por correo electrónico 17P@tarrantcounty.com.



Para información adicional, visite nuestra página de internet *17P Initiative Preterm Birth Prevention* (Una Iniciativa para la Prevención de Parto Prematuro 17P) en <http://health.tarrantcounty.com>.

Tarrant County Public Health 17P Initiative

A program for prematurity prevention

¿Cree que está en riesgo de tener un parto prematuro? Hay algo que usted puede hacer sobre eso.

- Un parto prematuro es cuando un bebé nace antes de completar las 37 semanas de gestación o más de tres semanas antes de su fecha de parto.
- Los bebés prematuros pueden presentar daño cerebral, problemas respiratorios y problemas de visión, incluso pueden morir.
- Los bebés afroamericanos tienen un mayor riesgo de nacer prematuros, pero el parto prematuro afecta a los bebés de todas las razas y etnias.
- El mayor riesgo de tener un parto prematuro es el haber tenido uno anteriormente.
- Mujeres que han tenido un bebé prematuro necesitan atención especial cuando están embarazadas.
- Para bebés, demorar un parto prematuro por una o dos semanas puede hacer una gran diferencia.

La 17P es una medicina de progesterona que puede ayudar a prevenir el parto prematuro en algunas mujeres embarazadas.

Vea el reverso de esta tarjeta para las preguntas más frecuentes en relación con 17P.